

डी ह्यूस पिग फीड

खिलाने के लिए दिशा निर्देश

सूअर पालने के धंधे के लिए, सूअरों को खुराक देने का सही तरीका जानना बहुत महत्वपूर्ण है। सूअर एवं मादा सूअर और उनके बच्चों को कुशल तरीके से खुराक देने से खर्च की बचत होती है। पर यह किसान के व्यक्तिगत हालात पर निर्भर करता है। इस पत्रक में खुराक खिलाने के आम दिशा निर्देश दिये गये हैं। व्यक्तिगत हालातों के अनुसार फीड की सलाह लेने के लिए हमारे विशेषज्ञों के साथ सम्पर्क करें।

ग्रोअरज

जन्म से आखिर तक


खुराक खिलाने के लिए सही सलाह, और खुराक बदलने का समय

दिन	फीड	मात्रा प्रति दिन	हफ्ते में फीड की लागत (कि:ग्राम)	कुल फीड (कि:ग्राम)	हफ्ते के शुरू में भार (कि:ग्राम)
0-6	स्टार्टर	0	0	14.56	1.5
7-13	स्टार्टर	10 ग्राम	0.07		3
14-20	स्टार्टर	30 ग्राम	0.21		4
21-27	स्टार्टर	40 ग्राम	0.28		6
28-34	स्टार्टर	200 ग्राम	1.4		8
35-41	स्टार्टर	400 ग्राम	2.8		9
42-48	स्टार्टर	600 ग्राम	4.2		11
49-55	स्टार्टर	800 ग्राम	5.6		15
56-62	ग्रोअर	900 ग्राम	6.3	91	20
63-69	ग्रोअर	1.1 कि.ग्रा.	7.7		26
70-76	ग्रोअर	1.3 कि.ग्रा.	9.1		32
77-83	ग्रोअर	1.6 कि.ग्रा.	11.2		38
84-90	ग्रोअर	1.8 कि.ग्रा.	12.6		44
91-97	ग्रोअर	2 कि.ग्रा.	14		51
98-104	ग्रोअर	2.1 कि.ग्रा.	14.7		58
105-111	ग्रोअर	2.2 कि.ग्रा.	15.4		65
112-118	फिनिशर	2.3 कि.ग्रा.	16.1	138.95	72
119-125	फिनिशर	2.4 कि.ग्रा.	16.8		78
126-132	फिनिशर	2.5 कि.ग्रा.	17.5		84
133-139	फिनिशर	2.5 कि.ग्रा.	17.5		90
140-146	फिनिशर	2.5 कि.ग्रा.	17.5		96
147-153	फिनिशर	2.55 कि.ग्रा.	17.85		102
154-160	फिनिशर	2.55 कि.ग्रा.	17.85		108
161-166	फिनिशर	2.55 कि.ग्रा.	17.85		113
167-174	फिनिशर	2.55 कि.ग्रा.		118	

- एक हफ्ते की ऊपर से स्टार्टर फीड शुरू करें। थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार दें।
- पहले हफ्ते कमरे का तापमान 28°C रखें।
- हमेशा साफ और ताजा पानी दें।
- दूध छुड़ाने पर 24 घंटे लाईटें जला कर रखें
- हमेशा स्टार्टर फीड और ग्रोअर फीड खुली मात्रा में दें।
- स्टार्टर फीड से ग्रोअर फीड धीरे धीरे बदलें। बढ़िया नतीजे लेने के लिए एक हफ्ता दोनों को मिक्स करके दें।
- मीट क्वालिटी में सुधार के लिए ज्यादा फीड खाना से रोकना चाहिए और अगर जरूरत हो तो खरसी जानवरों की फीड सीमित कर दें।

मादा सूअर

फीड खिलाने के लिए सलाह



गर्भवती और दूध देने वाली मादा सूअर के लिए फीड सारणी

कम से कम 2.5 लीटर ताजा पानी प्रति किलो फीड दें । पर खुला ताजा पानी देना बहुत ही अच्छा है ।

समय	फीड	फीड (कि.ग्रा.) प्रति मादा सूअर प्रति दिन कमजोर मादा सूअर को 35 दिन तक 500 ग्राम अधिक और 35 से 80 दिन तक 250 ग्राम अधिक फीड दें ।	फीड (कि.ग्रा.) प्रति दिन पहलीबार बच्चे देने वाली मादा सूअर के लिए
गर्भधारण से पहले 5 दिन	साउ		3.2
दूध छुड़ाने से गर्भधारण तक	साउ	3.5 (खुली)	
गर्भधारण से 35 दिन तक ।	साउ	2.6	2.2
35 दिन से 80 दिन तक ।	साउ	2.3	2.3
81 दिन से 107 दिन तक ।	साउ	2.9	2.9
108 दिन से 112 दिन तक ।	साउ	2.9	2.9
113वां दिन	लैकटेशन	2.7	2.5
114वां दिन	लैकटेशन	2.5	2.0
115वां दिन (बच्चे देने के समय)	लैकटेशन	0 - 2.5	0 - 2.0
दिन 1	लैकटेशन	2.5	2.0
दिन 2	लैकटेशन	3.0	2.5
दिन 3	लैकटेशन	3.5	3.0
दिन 4	लैकटेशन	4.0	3.5
दिन 5	लैकटेशन	4.5	4.0
दिन 6	लैकटेशन	5.0	4.5
दिन 7	लैकटेशन	5.5	5.0
दिन 8	लैकटेशन	6.0	5.5
दिन 9	लैकटेशन	6.5	6.0
दिन 10	लैकटेशन	7.0	6.5
दिन 11	लैकटेशन	7.5	7
दिन 12 से दूध छुड़ाने तक ।	लैकटेशन	8.0	7.5

आप 108 दिन से बच्चे देने तक भी साउ फीड दे सकते हैं । (हालांकि लैकटेशन फीड की सलाह दी गई है) 108 दिन से पहले लैकटेशन फीड ना दें ।

दूध दे रही मादा सूअर के लिए फीड

मादा सूअर को 500 ग्राम फीड प्रति पिगलेट और 2 किलोग्राम फीड मादा सूअर के लिए दें । पहलीबार बच्चे देने वाली मादा सूअर को 500 ग्राम फीड प्रति पिगलेट और 1.5 किलोग्राम: फीड मादा सूअर के लिए दें । हमेशा खुला व ताजा पानी दें ।

पिगलेट्स की गिनती	ज्यादा से ज्यादा फीड	
	मादा सूअर	पहलीबार बच्चे देने वाली मादा सूअर
4	4	3.5
5	4.5	4
6	5	4.5
7	5.5	5
8	6	5.5
9	6.5	6
10	7	6.5
11	7.5	7
12	8	7.5