

ਡੀ ਹੋਅਸ ਪਿੱਗ ਫੀਡ

ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੂਰ ਪਾਲਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਲਈ, ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੂਰਾਂ, ਸੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾਉਣ ਦੇ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸਥਾਰਤ ਕੁਸ਼ਲ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ

ਗੋਅਰਜ਼

ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਤੱਕ


ਖੁਰਾਕ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ, ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ

ਦਿਨ	ਫੀਡ	ਮਾਤਰਾ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ	ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਦੀ ਲਾਗਤ (ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:)	ਕੁਲ ਫੀਡ (ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:)	ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰ (ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:)
0-6	ਸਟਾਰਟਰ	0	0	14.56	1.5
7-13	ਸਟਾਰਟਰ	10 ਗ੍ਰਾਮ	0.07		3
14-20	ਸਟਾਰਟਰ	30 ਗ੍ਰਾਮ	0.21		4
21-27	ਸਟਾਰਟਰ	40 ਗ੍ਰਾਮ	0.28		6
28-34	ਸਟਾਰਟਰ	200 ਗ੍ਰਾਮ	1.4		8
35-41	ਸਟਾਰਟਰ	400 ਗ੍ਰਾਮ	2.8		9
42-48	ਸਟਾਰਟਰ	600 ਗ੍ਰਾਮ	4.2		11
49-55	ਸਟਾਰਟਰ	800 ਗ੍ਰਾਮ	5.6		15
56-62	ਗੋਅਰ	900 ਗ੍ਰਾਮ	6.3	91	20
63-69	ਗੋਅਰ	1.1 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	7.7		26
70-76	ਗੋਅਰ	1.3 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	9.1		32
77-83	ਗੋਅਰ	1.6 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	11.2		38
84-90	ਗੋਅਰ	1.8 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	12.6		44
91-97	ਗੋਅਰ	2 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	14		51
98-104	ਗੋਅਰ	2.1 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	14.7		58
105-111	ਗੋਅਰ	2.2 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	15.4		65
112-118	ਫਿਨੀਸ਼ਰ	2.3 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	16.1	138.95	72
119-125	ਫਿਨੀਸ਼ਰ	2.4 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	16.8		78
126-132	ਫਿਨੀਸ਼ਰ	2.5 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	17.5		84
133-139	ਫਿਨੀਸ਼ਰ	2.5 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	17.5		90
140-146	ਫਿਨੀਸ਼ਰ	2.5 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	17.5		96
147-153	ਫਿਨੀਸ਼ਰ	2.55 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	17.85		102
154-160	ਫਿਨੀਸ਼ਰ	2.55 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	17.85		108
161-166	ਫਿਨੀਸ਼ਰ	2.55 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:	17.85		113
167-174	ਫਿਨੀਸ਼ਰ	2.55 ਕਿ:ਗ੍ਰਾ:		118	

- ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਰ ਫੀਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਓ।
- ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 28°C ਰੱਖੋ।
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ।
- ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਦੀਆਂ ਰੱਖੋ।
- ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟਰ ਫੀਡ ਅਤੇ ਗਰੋਅਰ ਫੀਡ ਖੁੱਲੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਿਓ।
- ਸਟਾਰਟਰ ਫੀਡ ਤੋਂ ਗਰੋਅਰ ਫੀਡ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲੋ। ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।
- ਮੀਟ ਕੁਆਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੀਡ ਖਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੱਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਫੀਡ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਓ।

ਸੂਰੀਆਂ

ਫੀਡ ਖਿਲਾਉਣ ਲਈ ਸਲਾਹ



ਗੱਭਣ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕੀ ਵਿਉਂਤ

ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5 ਲੀਟਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤਿ ਕਿਲੋ ਫੀਡ ਦਿਉ। ਪਰ ਖੁਲ੍ਹਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੈ।

ਸਮਾਂ	ਫੀਡ	ਫੀਡ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.) ਪ੍ਰਤਿ ਸੂਰੀ ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ <small>ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਰੀਆਂ ਨੂੰ 35 ਦਿਨ ਤੱਕ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਅਤੇ 35 ਤੋਂ 80 ਦਿਨ ਤੱਕ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਵੱਧ ਫੀਡ ਦਿਉ।</small>	ਫੀਡ (ਕਿ.ਗ੍ਰਾ.) ਪ੍ਰਤਿ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਸੁਣ ਵਾਲੀ ਸੂਰੀ ਲਈ
ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਦਿਨ	ਸਾਓ		3.2
ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਤੋਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੱਕ	ਸਾਓ	3.5 (ਖੁਲ੍ਹੀ)	
ਗਰਭਧਾਰਨ ਤੋਂ 35 ਦਿਨ ਤੱਕ	ਸਾਓ	2.6	2.2
35 ਦਿਨ ਤੋਂ 80 ਦਿਨ ਤੱਕ	ਸਾਓ	2.3	2.3
81 ਦਿਨ ਤੋਂ 107 ਦਿਨ ਤੱਕ	ਸਾਓ	2.9	2.9
108 ਦਿਨ ਤੋਂ 112 ਦਿਨ ਤੱਕ	ਸਾਓ	2.9	2.9
113 ਵਾਂ ਦਿਨ	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	2.7	2.5
114 ਵਾਂ ਦਿਨ	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	2.5	2.0
115 ਵਾਂ ਦਿਨ	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	0 - 2.5	0 - 2.0
ਦਿਨ 1	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	2.5	2.0
ਦਿਨ 2	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	3.0	2.5
ਦਿਨ 3	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	3.5	3.0
ਦਿਨ 4	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	4.0	3.5
ਦਿਨ 5	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	4.5	4.0
ਦਿਨ 6	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	5.0	4.5
ਦਿਨ 7	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	5.5	5.0
ਦਿਨ 8	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	6.0	5.5
ਦਿਨ 9	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	6.5	6.0
ਦਿਨ 10	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	7.0	6.5
ਦਿਨ 11	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	7.5	7
ਦਿਨ 12 ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਉਣ ਤੱਕ	ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ	8.0	7.5

ਤੁਸੀਂ 108 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਓ ਫੀਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫੀਡ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)। 108 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਫੀਡ ਨਾ ਦਿਉ।

ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸੂਰੀਆਂ ਲਈ ਫੀਡ

ਸੂਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਡ ਪ੍ਰਤਿ ਪਿਗਲੈੱਟ ਅਤੇ 2 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਫੀਡ ਸੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਉ ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਸੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਰੀਆਂ ਨੂੰ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀਡ ਪ੍ਰਤਿ ਪਿਗਲੈੱਟ ਅਤੇ 1.5 ਕਿ.ਗ੍ਰਾ. ਫੀਡ ਸੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿਉ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦਿਉ।

ਪਿਗਲੈੱਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ	ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਡ	
	ਸੂਰੀਆਂ	ਪਹਿਲੀਵਾਰ ਸੂਰੀ
4	4	3.5
5	4.5	4
6	5	4.5
7	5.5	5
8	6	5.5
9	6.5	6
10	7	6.5
11	7.5	7
12	8	7.5